

Primeira ocorrência de *Lutzomyia clautrei* (Abone, Léger & Fauran, 1979) (Diptera: Psychodidae) no Estado de Alagoas, Brasil

Autores: ¹Carlos F. R. Santos, Ana L. M. Macena, Cláudia M. Rodarte

Instituição: ¹ Centro de Controle de Zoonoses de Maceió, Coordenação de Entomologia

Relata-se a primeira ocorrência de espécies de *Lutzomyia clautrei* Abone, Léger & Fauran, 1979 na área urbana de Maceió, estado de Alagoas. Este município fica localizado na região leste do estado, na Zona Litorânea sob as coordenadas 9°39'56" S, 35°44'7" E. Foi realizada a captura de flebotomíneos no bairro de Benedito Bentes utilizando armadilhas luminosas do tipo CDC (Center for Disease Control and Prevention). As capturas de flebotomíneos foram realizadas das 18 às 06 horas, no período de 13 a 30/07/2015. Entre os flebotomíneos capturados foram encontrados um macho e duas fêmeas de *Lu. clautrei*. Os flebotomíneos capturados foram separados quanto ao sexo (macho/fêmea), após a eutanásia dos mesmos em éter. Após essa etapa, os flebotomíneos foram acondicionados em criotubos no álcool a 70% para posterior montagem e identificação no Laboratório de Entomologia do Centro de Controle de Zoonoses de Maceió, com o auxílio da chave dicotômica descrita por Young & Duncan, 1994.

Palavras-chaves: flebotomíneo, Alagoas, espécies