

Ataque isquêmico transitório e óbito durante tratamento para Leishmaniose Visceral

Paulo V. V. Mata¹; Monique de F. Dantas¹; Amanda V. de C. Souza¹; Hilton R. de A. Silva¹; Cleide de S. Araújo¹; Celia M. S. Pedrosa²

¹Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, Campus A.C. Simões, Av. Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro dos Martins, CEP:57072-900, Maceió - AL. ²Hospital Escola Dr. Hέλvio Auto, Rua Cônego Fernando Lyra s/n - Trapiche da Barra – Maceió - AL. CEP: 57.017-420

A droga de escolha para tratamento de Leishmaniose Visceral (LV) no Brasil é o Glucantime. São relatadas alterações eletrocardiográficas durante o uso da medicação que predispõem a formação de tromboembolismos. Um ataque isquêmico transitório (AIT) tem duração média de 10 a 20 minutos e seus sintomas se resolvem nas próximas vinte e quatro horas. Trata-se de um estudo descritivo tipo relato de caso aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE: 43602315.1.0000.5013 em 05/05/2015). Paciente do sexo masculino, 65 anos, etilista crônico, foi internado no centro de referência de Alagoas para doenças infectocontagiosas com história de dor abdominal, perda de peso e constipação há cinco dias. Ao exame estava em regular estado geral, eupneico, mucosas conjuntivais hipocoradas (3/4), temperatura de 36,5°C, pressão arterial de 90x70mmHg e hepatoesplenomegalia. A punção medular evidenciou no esfregaço amastigostas de *Leishmania sp.* Iniciado tratamento com Glucantime. No vigésimo sexto dia de tratamento apresentou mal-estar três horas após o uso de Glucantime, estando dispneico, afásico, hipocorado, hiporreativo, instalado por cateter nasal. Ao exame físico, presença de roncos difusos, ausculta cardíaca dificultada devido respiração ruidosa, pressão arterial de 140x80mmHg, diminuição de força em dimídio esquerdo, hiporreflexia plantar esquerda. Na mesma noite, pequena melhora do quadro clínico, paciente reativo e deambulando com auxílio. No dia seguinte, possuía ausência de pulso central, midríase parálitica, silêncio auscultatório, sinais de má perfusão. Iniciada manobras de ressuscitação para parada cardiorrespiratória, óbito constatado dez minutos depois. Idosos são susceptíveis a AIT. Pela resolução dos sintomas vinte e quatro horas após o quadro, trata-se de AIT em paciente após tratamento para Calazar com o uso de Glucantime. A idade avançada é fator de risco para eventos vasculares isquêmicos. Não foram realizados exames de imagem para avaliar outros diagnósticos diferenciais.

Palavras-chave: Leishmaniose Visceral, ataque isquêmico transitório, tratamento.

Apoio: Não há.