

Edema linfático no membro inferior em vítima de acidente botrópico na Região Amazônica

Iran M Silva¹; Jacqueline A. G. Sachett¹; Sâmella S. Oliveira¹; Ana P. B. Damião²; Josué N. Brutos²; Eliane C. Alves³; Sanmile C. N. Holanda²; Geraldo M. Soares⁴; Luiz C. L. Ferreira⁴; Wuelton M. Monteiro⁴

¹ Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical – Universidade do Amazonas – UEA/FMT HVD – aluno de Doutorado. Av. Pedro Teixeira, 25 - Dom Pedro, 69040-000, Manaus – AM.

² Bolsista FAPEAM-Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado. Av. Pedro Teixeira, 25 - Dom Pedro, 69040-000, Manaus – AM.

³ Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical – Universidade do Amazonas – UEA/FMT HVD – aluno de mestrado. Av. Pedro Teixeira, 25 - Dom Pedro, 69040-000, Manaus – AM.

⁴ Centro de Pesquisas em Acidentes por Animais Peçonhentos – Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado – FMT-HVD. Av. Pedro Teixeira, 25 - Dom Pedro, 69040-000, Manaus – AM.
Email: silva.iran@ig.com.br

O acidente ofídico apesar de considerado como agravo à saúde negligenciado, tem a mais elevada incidência na região Norte, em torno de 52,6 casos/100.000 habitantes. Sua abordagem como acidente ocupacional, em sido cada vez mais discutida, em especial na Região Amazônica, pela diversidade de atividades laborativas em regiões onde se encontram as serpentes. As atividades agrícolas, tanto no plantio como no extrativismo, assim como na pesca e caça são vitais para a sobrevivência da população nativa. As dificuldades de atendimento pela carência e distância dos serviços de saúde resultam em sequelas com implicações incapacitantes para as vítimas. Descrevemos um caso de edema linfático em membro inferior esquerdo causado por acidente botrópico em paciente de 77 anos, do sexo masculino, natural de Tapauá (AM). A primeira picada ocorreu no pé esquerdo há 30 anos enquanto extraia borracha em um seringal, na ocasião teve edema e eritema local, não procurando assistência médica evoluiu com recidivas de edema, eritema e prurido local. Poucos anos depois foi novamente picado por uma serpente da espécie *Bothrops atrox* no terceiro pododáctilo esquerdo, também sem a assistência médica adequada. Atualmente apresenta edema linfático de longa evolução no membro acometido, observado ao exame físico assim como na radiografia e ultrassonografia do pé esquerdo (figuras 1, 2 e 3). O hemograma completo, provas de coagulação sanguínea e de função renal resultaram normais em 18/03/2016. O paciente foi encaminhado para avaliação do angiologista e da cirurgia vascular. Estratégias adequadas como: capacitação dos profissionais de saúde, melhor acesso das vítimas aos serviços e fornecimento do soro com disponibilidade cada vez mais próxima de suas vítimas, devem ser implantadas a fim de evitar sequelas incapacitantes na população nativa.

Palavras-chave: acidente ofídico; *Bothrops atrox*; edema linfático; Amazonas.

Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM