

Perfil epidemiológico da Leishmaniose Tegumentar Americana no município de Santarém no período de 2007 a 2014

Raphael P. M. de Sousa¹; Francileno S. Rêgo²; Camila Louise Barroso Teixeira¹; Iris de Barros Vaz Teixeira¹.

¹ Universidade do Estado do Pará - Campus XII, 68040090, Santarém - PA. ² Docente da Universidade do Estado do Pará, 66113200, Santarém-PA. e-mail: francileno@bol.com.br.

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença que acomete pele e mucosas, causada por parasitas dermatrópicos do gênero *Leishmania*. Esses parasitos são transmitidos através da picada de flebotomíneos, pequenos dípteros da família *Psychodidae*. No Brasil a LTA é encontrada em todos os estados, sobretudo na Região Norte e Nordeste. Dados do SINAN, no período de 2007 a 2014, no município de Santarém-Pará, permitem avaliar um perfil epidemiológico, com uma incidência média de 37 / 100.000 habitantes de casos confirmados na região, com uma população de 294.580 habitantes. Os dados também referem uma distribuição de casos da LTA em Santarém predominante no espaço urbano com cerca de 53% (n=627), enquanto na zona rural foram encontrados 46% (n=542). O grupo mais acometido foi do gênero masculino com 86% (n=1015), na faixa etária 20 a 34 anos com 43% (n=506). Os registros constataam 80% (n=946) de casos autóctones. Verificou-se 1113 casos novos (94%) e 67 casos de recidiva (6%). Com os resultados é possível elencar ações de controle e vigilância em saúde mais eficientes dessa endemia.

Palavras-chave: Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), Epidemiologia, Doenças infecciosas e parasitárias.