

Perfil epidemiológico da Leishmaniose Tegumentar Americana no Município de Presidente Figueiredo-Amazonas.

Natasja M Santana¹, Maria F S Rodrigues⁴, Maria E C Soares², Adriana S S Calixto³ Maria das G. V. Barbosa⁴, Daniel T Mota⁵.

¹ Centro Universitário do Norte, ²Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Figueiredo ³Universidade do Estado do Amazonas ⁴Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado. ⁵Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde- FIOTEC

Introdução: A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença que tem ampla distribuição mundial e no Continente Americano são registrados casos desde o extremo sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina, com exceção do Chile e Uruguai. No continente americano, o Brasil é o país que apresenta a mais alta incidência. No estado do Amazonas é prevalente em grande parte dos municípios, inclusive Presidente Figueiredo onde a doença tem sido registrada com frequência. **Objetivo:** Realizar uma pesquisa sobre o perfil epidemiológico da LTA no município de Presidente Figueiredo – AM, no período de 2010 a 2014. **Metodologia:** A pesquisa foi realizada através de análise de fichas de investigação epidemiológica da LTA, por meio do Sistema de Informação de Agravos Notificáveis (SINAN) e livros de registros de casos LTA dos últimos cinco anos. **Resultados:** Foram diagnosticados 670 casos, com uma média de 134 casos por ano de LTA no período avaliado. Os casos ocorreram de forma irregular entre as localidades, com maior concentração nas comunidades da zona rural 326 (49%); na AM 240 182 (27%) e na área urbana 162 (24%) casos; maior proporção 431(64%) ocorreu no sexo masculino com faixa etária entre 20 a 49 anos de idade. **Discussão:** As notificações registradas nestes cinco anos foram distribuídas irregularmente entre as localidades e o elevado número de notificações pode estar relacionado com o deslocamento de pessoas infectadas de outras regiões, assim como relatado em outros trabalhos no estado do Amazonas. A predominância dos casos ocorreu em 431 indivíduos do sexo masculino corroborando com outros estudos que sugerem maior risco para aquisição da LTA devido realizarem atividades laborais em ambiente de floresta. **Conclusão:** Observou-se que o registro da LTA no município ocorreu de forma irregular e com maior incidência entre as localidades da área rural; em maior proporção em indivíduos do sexo masculino com predominância de casos na faixa etária entre 20 a 49 anos de idade.

Palavras-chave: Perfil Epidemiológico; Leishmaniose, Presidente Figueiredo