Incidência de chikungunya em maiores de 45 anos notificados em 2016 no município de Maceió, Alagoas, Brasil

Sarah M.C. da P. de Lima¹; Ítalo B. de Oliveira¹; Ayrton S. Alves¹; Maria F.C Orsolete¹; Gabriela S. Vieira de Mello²

¹Acadêmico do curso de graduação em Medicina do Centro Universitário CESMAC, Maceió, Alagoas, Brasil. Emails: scoelho_lima@icloud.com, italobeko@gmail.com, ayrton5814@gmail.com, flavia.orsolete@hotmail.com

²Docente titular do Centro Universitário CESMAC, Maceió, Alagoas, Brasil. Email: gabrielavmello@hotmail.com

As manifestações articulares são descritas como o principal quadro clínico que diferencia a chikungunya da dengue, e embora a dengue também possa começar com poliartralgia, esse é geralmente o fenômeno mais importante em termos de morbidade nos casos de chikungunya. A evolução da chikungunya para formas subaguda e crônica inclui poliartralgia, poliartrite, tenossinovite-entesopatia, e em 63% dos casos a presença desses sintomas se manteve por até um ano e meio após a infecção inicial, incluindo neuropatias e depressão. A sociedade brasileira de dengue/arboviroses afirma que idade superior a 45 anos, sexo feminino, artropia ou cardiopatia prévia são fatores de risco para aumento da morbidade decorrente da chikungunya. O objetivo da pesquisa foi identificar os casos estabelecendo a incidência, a fim de direcionar melhores ações em saúde para o esclarecimento da população sobre a patologia. Foi realizado um levantamento da faixa etária dos pacientes acometidos pela chikungunya na cidade de Maceió entre janeiro e maio de 2016 através das fichas de notificações compulsória fornecidas pelo SINAN. A incidência total foi de 95 notificações, onde 33,68% (32) apresentavam idade superior a 45 anos, 19 mulheres e 13 homens. Uma vez que a idade é um importante fator de risco para a morbidade da chikungunya, a identificação desses pacientes possibilitará uma intervenção profilática para retardar ou anular os efeitos dos sinais e sintomas de morbidade, contribuindo para o direcionamento das ações em saúde, priorizando pacientes de risco ou com chances de aumento da morbidade por patologias prévias.

Palavras-chave: chikungunya, faixa etária, Maceió.

Apoio: Financiamento próprio