

Prevalência e fatores associados à infecção pelo *Treponema pallidum* entre usuários de drogas ilícitas no município de Capanema, Pará, Brasil

Eliezer D. Marques¹; Ana C. C. Cordeiro²; Paula C. R. Frade²; Divino B. Cunha¹; Lucinaldo S. Blandtt¹; Luiz M. L. Pinheiro³; Aldemir B. O. Filho¹

¹Instituto de Estudos Costeiros, Universidade Federal do Pará, Bragança PA, Brasil. ²Residência Integrada Multiprofissional em Atenção à Saúde da Mulher e da Criança, Universidade Federal do Pará, Bragança PA, Brasil. Email: olivfilho@ufpa.br. ³Campus do Marajó – Soure, Universidade Federal do Pará, Soure PA, Brasil.

A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica de evolução crônica, de transmissão sexual, vertical e sanguínea causada pelo *Treponema pallidum*. Aspectos sociais, biológicos, culturais e comportamentais influenciam a ocorrência da doença na população, em especial em grupos de vulneráveis. Este trabalho determinou a prevalência e os fatores associados à sífilis entre usuários de drogas ilícitas (UD) no município de Capanema, Pará, norte do Brasil. Este estudo epidemiológico foi constituído por amostragem de conveniência (não probabilística) de UD no município de Capanema (01°11'45"S 47°10'51"O), nordeste do Pará. O diagnóstico da infecção pelo *T. pallidum* foi feito por teste qualitativo rápido para sífilis. Todos os UD responderam questionário sobre possíveis fatores risco à infecção pelo *T. pallidum*. As informações obtidas foram ordenadas e comparadas através dos testes qui-quadrado e Odds Ratio, e tendo como valor de significância $p < 0,05$. Este estudo abordou 95 UD, a maioria pertencente ao sexo masculino e média de idade em torno de 32 anos. Além disso, muitos usuários apresentavam reduzida escolaridade e renda mensal em torno de um salário mínimo. O consumo de maconha + pasta de cocaína, crack e maconha foi predominante. Entretanto, a maioria dos UD informou já ter utilizado mais de uma droga ilícita durante a vida. A prevalência de sífilis foi de 24,2%. Após a realização de análise univariada, cinco fatores foram associados à infecção pelo *T. pallidum*: tempo de uso de drogas superior a três anos, sexo desprotegido, sexo com outro usuário de drogas, prostituição e mais de cinco parceiros sexuais nos últimos 12 meses. Em suma, este estudo obteve importantes informações epidemiológicas sobre a infecção pelo *T. pallidum* entre UD no município de Capanema, as quais poderão auxiliar no direcionamento de estratégias de controle e de prevenção dessa infecção.

Palavras-chave: Uso de drogas, Epidemiologia, Sífilis.

Apoio: MS/SVS, CNPQ.