

Toxoplasmose congênita em lactente: relato de caso

Edjanieire M. Q. da Silva¹; Aline C. Cardoso¹; Juliana O. de Araújo¹; Hiule P. de Santana¹; Amuzza A. P. dos Santos², Ingrid M. L. Lúcio²

¹Discentes da Escola de Enfermagem e Farmácia, Curso de Enfermagem, Universidade Federal de Alagoas, Av. Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro dos Martins, 57072-900, Maceió, AL, Brasil. Email: Nieire.quirino@hotmail.com. ²Docentes da Escola de Enfermagem e Farmácia, Universidade Federal de Alagoas, Av. Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro dos Martins, 57072-900, Maceió, AL, Brasil.

A toxoplasmose é uma zoonose causada pelo protozoário *Toxoplasma gondii*. Nas Américas central e sul estima-se que 50 a 80% da população humana adulta apresente sorologia positiva para a toxoplasmose. A toxoplasmose congênita é uma doença infecciosa que resulta da transferência transplacentária do *Toxoplasma gondii* para o concepto, decorrente de infecção primária materna durante a gestação ou por reagudização de infecção prévia em mães imunodeprimidas. É mais comum em países tropicais. Hábitos alimentares, higiênicos, população de gatos e climas quentes favorecem a infecção. Objetivou-se relatar um caso de toxoplasmose congênita na atenção terciária, por meio do estudo da história clínica, entrevista com a mãe, dados obtidos do prontuário e acompanhamento do paciente, com seu consentimento. O acompanhamento ocorreu em maio do ano de 2015, na pediatria do HUPAA, durante as atividades práticas supervisionadas da disciplina intervenção de enfermagem no processo saúde/doença da criança e do adolescente. Lactente do sexo masculino com 8 meses e 14 dias de nascido, encontra-se no seu 15º dia de internação hospitalar. Apresenta retardo no crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor, microcefalia, microftalmia e opacificação do cristalino. Em uso de Prednisona, Sulfadiazina, Pirimetamina, Ácido folínico, Paracetamol, Bromoprida. Acompanhamento de enfermagem: administração de medicamentos conforme prescrição médica, sinais vitais, exame físico diário, orientação a acompanhante. A toxoplasmose congênita constitui um grave problema de saúde pública pela elevada morbimortalidade, resultando num impacto socioeconômico importante, principalmente se a criança for afetada por retardo neuropsicomotor e cegueira. Assim sendo, se faz necessário o acompanhamento sorológico periódico durante toda a gestação nas mulheres soronegativas, buscando o diagnóstico e tratamento precoce.

Palavras-chave: Toxoplasmose; Lactente; Assistência de enfermagem.