

## Assistência de enfermagem ao paciente com Síndrome de Fournier

Tiago F. Dantas<sup>1</sup>; Chrisllaine R. Maciel<sup>2</sup>; Edja S. S. de Carvalho<sup>3</sup>; Mayara P. S. Silva<sup>4</sup>; Suzanne B. de Albuquerque<sup>5</sup>; Verônica de M. Alves<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Graduando de Enfermagem pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), (82) 99960-3770, 57330-000 Lagoa da Canoa, AL, Brasil. E-mail: thyago\_dantys@hotmail.com <sup>2</sup>Graduanda de Enfermagem pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), 57305-010, Arapiraca, AL, Brasil. <sup>3</sup>Graduanda de Enfermagem pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), 57360-000, Girau do Ponciano, AL, Brasil. <sup>4</sup>Graduanda de Enfermagem pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), 57314-130, Arapiraca, AL, Brasil. <sup>5</sup>Graduanda de Enfermagem pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), 57305-370, Arapiraca, AL, Brasil. <sup>6</sup>Doutora em Saúde Mental pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPUB/UFRJ), 57309-005, Arapiraca, AL, Brasil.

A Síndrome de Fournier é uma patologia infecciosa grave, de rápida progressão, que acomete a região genital e áreas adjacentes, caracterizada por uma intensa destruição tissular, envolvendo o tecido subcutâneo e a fáscia. A predisposição para a síndrome está associada a estados de imunossupressão, doenças crônicas, como diabetes mellitus, doenças vasculares, senilidade, obesidade mórbida, anormalidades no sistema urológico, doenças colorretais e comportamentos como: uso abusivo de drogas e alcoolismo. O estudo tem por objetivo evidenciar a assistência de enfermagem ao paciente com Síndrome de Fournier. Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência realizado por estudantes no decurso das aulas práticas da disciplina Saúde do Adulto II do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). As práticas ocorreram na clínica médica e cirúrgica em um hospital no município de Arapiraca, Alagoas. Os dados foram obtidos por meio de anamnese, exame físico completo e intervenções de enfermagem. Após anamnese e exame físico, foi elaborado um plano de cuidados evidenciando as reais necessidades do paciente, assistindo-o de modo integral. Os cuidados de enfermagem ao paciente portador de Síndrome de Fournier devem ser pautados na rigorosa monitoração dos sinais vitais, constante avaliação da área lesionada, administração do medicamento de escolha para o tratamento e realização de curativos periodicamente, bem como as orientações ao paciente e a família acerca do autocuidado, dieta e higienização eficaz na área lesionada. No mais, o acolhimento, escuta qualificada e o esclarecimento acerca da doença, contribui para a diminuição da ansiedade decorrente do estado de saúde e se configuram como fatores indispensáveis no tratamento. Assim, é evidente que a assistência integral e a elaboração de um plano de cuidados individualizado favorecem um bom prognóstico e refletem na qualidade de vida do paciente durante sua internação e após a alta hospitalar.

**Palavras-chave:** Assistência de enfermagem, Síndrome de Fournier, Saúde do Adulto.