

Doença de Whipple em paciente HIV positivo

Helena Duani¹; Bruno R. Silva¹; Otavio B. Thomazi¹; Francisco E. Arantes¹; Leticia B. Azevedo¹; Carlos M. Moreira¹; Thiago A. Fidelis¹; Eduardo P. Júnior¹; Henrique V. Gama¹; Ana L. Mendes¹; José R. Lambertucci¹.

¹Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Av. Professor Alfredo Balena, 110, Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Email: hduani@gmail.com

A doença de Whipple é uma doença sistêmica, caracterizada por infiltrado de macrófagos PAS positivos em todos os órgãos do corpo e pode causar síndrome disabsortiva grave por infectar a mucosa jejunoileal. A doença possui manifestações intestinais e extra intestinais, podendo acometer o sistema nervosa central. O agente etiológico é uma bactéria gram-positiva, a *Tropheryma whipplei*. A associação de doença de Whipple e Aids foi descrita poucas vezes na literatura. Neste trabalho descrevemos um caso de doença de Whipple em paciente HIV positivo. Trata-se de paciente masculino, 49 anos, portador de HIV há três anos, em uso regular de terapia antirretroviral, com carga viral indetectável, apresentando emagrecimento progressivo e diarreia crônica por cerca de seis meses. Foi realizada toda a propedêutica para diarreia crônica e emagrecimento, inclusive as associadas ao HIV e mostraram resultados negativos. Após realização de Endoscopia Digestiva Alta, as biópsias indicaram a presença de quadro anatomopatológico compatível com doença bacteriana corada por PAS e aventaram-se os diagnósticos diferenciais causados pela *Tropheryma whipple* e pelo complexo *Mycobacterium avium*. Outro achado à endoscopia foi a presença de uma ectasia vascular conhecida como “estômago em melancia”. O BAAR teve resultado negativo e foi excluído o diagnóstico de doença micobacteriana. O paciente foi tratado com Ceftriaxona por duas semanas apresentando melhora do quadro disabsortivo, ganho de peso e atualmente encontra-se em tratamento com sulfametoxazol-trimetoprima com boa resposta. Tão importante quanto aventar a possibilidade de doença de Whipple em pacientes infectados com HIV, é pensar que pacientes com sinais e sintomas sugestivos de AIDS (perda de peso, diarreia, febre de baixo grau etc.) possam na verdade ser portadores da doença de Whipple. Como se trata de quadro clínico semelhante, o diagnóstico de doença de Whipple em pessoas com HIV é pouco aventado mas precisa ser pensado em casos que há uma diarreia sem causa aparente e envolvimento de outros sistemas.

Palavras-chave: HIV, doença de Whipple, diarreia.