

Causas de óbitos em pacientes com tuberculose na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado

Lucilaide O. Santos^{1,2}; Larissa O. Cruz¹; Lorena P. de Souza^{1,2}; Irineide A. Antunes²; Kim V. A. Machado²; Leni Marreiro²; Micaela M. dos S. Mota¹; Monique F. dos Reis².

¹Universidade do Estado do Amazonas, Av. Djalma Batista, 2470, CEP: 69050-010, Manaus, AM, Brasil. ²Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado, Av. Pedro Teixeira, 25, CEP: 69.040-000, Manaus, AM, Brasil.. E-mail:lorennapsouza@gmail.com

Introdução: A tuberculose (TB) continua como uma das principais causas de morbidade e mortalidade em vários países, bem como um importante problema de saúde pública em nível mundial.

Objetivos: Estudar a mortalidade relacionada à tuberculose na FMTHVD segundo causas múltiplas de morte, no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2010.

Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, utilizando dados secundários, de óbito por tuberculose na FMTHVD.

Resultados: A idade média dos pacientes ao óbito foi de 34,46 anos (16±63; DP: 9,8). 38% dos óbitos ocorreram na faixa etária de 20 a 30 anos (n=19). A maioria dos pacientes apresentou tuberculose pulmonar, sendo dispnéia (n=17; 71%) e perda ponderal (n=11; 45,8%) os sintomas mais frequentes. A AIDS foi a doença associada mais frequente em ambos os sexos (masculino: n=27; feminino:n=20). As patologias mais comumente associadas ao HIV na amostra estudada foram diarreia (n=18; 38,3%) e toxoplasmose (n=11; 23,4%). Os esquemas de tratamento mais utilizados foram COXIP4 (n=25; 50%) e rifampicina+pirazinamida (n=16; 32%). A causa mais comum de óbito foi choque séptico (n=23; 46%), associado à pneumonia (n=9; 18%).

Conclusão: A AIDS e suas doenças associadas são as principais causas relacionadas ao óbito nos pacientes com tuberculose na FMTHVD.

Palavras-chave: mortalidade, tuberculose, HIV/AIDS.