

## **Conhecimento dos cirurgiões dentistas da rede privada do município de Pimenta Bueno – RO – em relação á soroconversão após a vacinação contra hepatite B**

**Mónica A. M. Suarez<sup>1</sup>; Sabrina Steffani dos S. Brito<sup>2</sup>; Camilo F. de O. Mattos<sup>3</sup>; Nayara Caroline S. Pierre<sup>4</sup>; Rafaela da S. Dias<sup>5</sup>; Alberto N. R. Júnior<sup>6</sup>; Denise Lêda Pedrini<sup>7</sup>; Juliana H. L. Santos<sup>8</sup>; Tatiana Roberta M. Furtado<sup>9</sup>; Zilanda M. de Almeida<sup>10</sup>**

<sup>1,2</sup>Graduadas em Odontologia, FACIMED, Cacoal, RO, Email: [sabrinaa.brito@hotmail.com](mailto:sabrinaa.brito@hotmail.com).

<sup>3,4,5</sup> Graduandos em Odontologia, FACIMED, Cacoal, RO, Email: [nayaracaroline\\_15@hotmail.com](mailto:nayaracaroline_15@hotmail.com). <sup>6</sup> Professor Faculdade de Medicina, UFC, Fortaleza, CE. Email: [Novaes@ufc.br](mailto:Novaes@ufc.br). <sup>7,8,9,10,11</sup> Professora de odontologia, Facimed, Cacoal, RO. Email: [zilanda.martins@bol.com.br](mailto:zilanda.martins@bol.com.br).

Considerado o maior avanço no controle da hepatite B, a vacina é a principal medida adotada e inserida no roteiro de imunização brasileiro. O esquema padrão de vacinação são: três doses de vacinas, ministradas em um intervalo de um a seis meses. É importante realizar o exame para verificação da soroconversão após a vacinação, pois mesmo após o esquema vacinal, alguns profissionais podem não estar imunizados. Este estudo tem como foco verificar a situação vacinal e a soroconversão a vacina contra hepatite B em profissionais da área de odontologia da rede privada que atuem na cidade de Pimenta Bueno/RO. Estudo transversal de caráter descritivo onde 21 profissionais cirurgiões dentistas responderam a um questionário. Das avaliações 80,95% tomaram as três doses da vacina; 61,90% não realizaram o exame anti-HBs para verificar a soroconversão e 42,86% acreditaram que as três doses seriam suficientes para a imunização. Infere-se com este trabalho que campanhas de vacinação para conscientizar os não vacinados precisam ser realizadas e, informações sobre a importância do monitoramento da resposta vacinal devem ser repassadas a esses profissionais.

**Palavras-chave:** Hepatite B. Vacinação. Imunização.