

Impacto das ações de monitoramento e acompanhamento dos pacientes com malária na redução do percentual de possíveis recidivas no município de Caracaraí-Roraima

Daniel T Mota¹, Joyce M. Pereira², Charles M. Bruster³, Marines M. Bassance⁴, Luciana Pires⁴, Marcela L. Dourado¹, Maria das G. V. Barbosa⁵

¹ Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde- FIOTEC

² Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle da Malária- MS

³ Coordenação de Endemias de Caracaraí, ⁴ Coordenação do Programa Estadual de Controle da Malária- Roraima ⁵ Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado.

Introdução: Na Amazônia os casos de malária ocorrem na maioria dos estados, contribuindo desta forma com 99,7% dos casos notificados no Brasil. Em Roraima, no município de Caracaraí a incidência parasitária anual (IPA) em 2015 chegou a 40,2/1000 habitantes, caracterizando essa área como médio risco de transmissão. Neste mesmo ano, houve aumento nos números de casos de malária por possíveis recidivas, sendo registrado um percentual de 42% no mês de maio. **Objetivo:** Monitorar os casos de malária por recidivas após o tratamento dispensado aos pacientes no município de Caracaraí- RR no período de junho a dezembro de 2015. **Métodos:** O monitoramento foi realizado através de investigações epidemiológicas, acompanhamento do esquema terapêutico por meio do tratamento supervisionado com base no peso e coletas de lâminas de verificação de cura (LVC) por meio da gota espessa em 16 pacientes com histórico de dois (02) ou mais episódios de recaídas no referido período. **Resultados:** Observou-se que os pacientes apresentaram recaídas devido a falha terapêutica associada a não adesão do tratamento de forma adequada tendo como principais motivos o uso de bebida alcoólica e banalização da doença. Após a estratégia do monitoramento, verificou-se que os pacientes obtiveram êxito na cura da doença constatada pela negativação da parasitemia na corrente sanguínea por meio das LVC. Além disso, este trabalho causou impacto significativo na redução de (42%) para (6%) nos casos de malária por recidiva no município de Caracaraí-RR. **Discussão:** A recidiva da malária é conceituada como a recorrência de parasitemia assexuada seguinte ao tratamento, após ter sido constatada a sua negativação, e geralmente ocorrem pela falha terapêutica resultante de não adesão ao tratamento, corroborando com as causas das recaídas identificada neste trabalho. **Conclusão:** Mediante ao exposto, este monitoramento foi considerado eficaz e deve ser continuado nas atividades de rotina de controle da malária no município.

Palavra-chave: Malária, recidivas, monitoramento.